

GENRE NOUVEAU DE STAPHYLINIEN

ET

DESCRIPTION DE NOUVELLES ESPÈCES DE COLÉOPTÈRES

DE SYRIE ET D'EUROPE,

Par M. le baron GAUTIER DES COTTES.

(Séance du 9 Octobre 1861.)

Genus PÆDEROMORPHUS.

De *Pæderus* (παιδερος), μορον, forme.

Caractères. — Corps allongé, parallèle, plus épais que dans le genre *Pæderus* Fab. Tête orbiculaire, aplatie, séparée du corselet par un énorme pédoncule transversal, formant un bourrelet convexe, subarrondi; palpes maxillaires médiocrement allongés, avant-dernier article subconique, pyriforme, tronqué à l'extrémité, dernier très petit, obtus; mandibules grandes, falciformes; antennes longues, filiformes, à articles subcylindriques, grossissant légèrement jusqu'à l'extrémité. *Prothorax globuleux, renflé, en forme de carré arrondi* à chacun de ses angles, plus étroit que l'abdomen. Écusson en triangle arrondi. Élytres tronquées en arrière. Abdomen linéaire, assez large, à côtés rebordés, derniers segments comme dans le genre *Pæderus*. Quatrième article tarsal des pattes postérieures légèrement bilobé.

NOTA. N'ayant pas disséqué les deux exemplaires qui m'ont été confiés, je n'ai pas pu tirer des caractères de la bouche.

Ce genre vient à côté du G. *Pæderus* Fab.; il n'en doit, peut-être même, former qu'une division; car il s'éloigne beaucoup des genres suivants, *Oedichirius* Er. et *Procirrus* Latr., tant par la forme des palpes que par les segments abdominaux non rebordés.

1. PÆDEROMORPHUS PEDONCULARIUS Gautier des Cottés.

Alatus, nitidus, fulvus. Capite nigro, ovali, rotundato, vage-punctato. Mandibulis nigris, elongatis, falciformibus, bidentatis. Oculis ovalibus, griseis. Totis palpis testaceis. Antennis testaceis, ultimis articulis leviter

fumigatis. Pedonculo fulvo, elevato, subovali. Prothorace fulvo, irregulariter punctato in lateribus. Scutello ferrugineo, asperiter punctato. Elytris cyaneis in suturâ nigris, rugoso-punctatis. Abdomine ferrugineo, leviter piloso, punctato; ultimis segmentis nigris. Pedibus ferrugineis, genubus leviter brunneis. — Long. 7 1/2 à 8 mill.

Habitat in Caramaniâ (Tarsous).

Ailé, brillant, d'un rouge ferrugineux, avec la tête, la poitrine et les deux derniers segments noirs.

La tête, en ovale arrondi, est largement et profondément ponctuée; les yeux ovalaires, gris; les mandibules noires, grandes, falciformes, bidentées; la bouche et les palpes entièrement testacés; les antennes à quatre premiers articles testacés, les autres un peu rembrunis. La tête se rattache au corselet par un pédoncule fauve, brillant, en ovale transversal, renflé. *Le corselet* (1) est de la même couleur que ce dernier, entièrement et irrégulièrement ponctué, sauf sur le disque qui est lisse et très brillant; la ponctuation sériale est toujours interrompue par d'autres points irréguliers, néanmoins on peut la suivre de chaque côté du disque. L'écusson est d'un brun foncé ferrugineux, rugueusement ponctué. Les élytres sont bleues, plus grandes que le corselet, à suture noire, relevée; largement et rugueusement ponctuées. L'abdomen est ferrugineux, légèrement poilu, ponctué, à côtés relevés. Jambes brunes à genoux légèrement obscurs.

Ce curieux insecte fait partie de la collection de M. Chevrolat, et a été rapporté de Tarsous par M. Wachanru, de Marseille.

2. POEDERUS MINUTUS Gautier des Cottés.

Alatus, nitidus, testaceus; capite ovali, sparse punctato, pectore, ultimis segmentis genibusque nigris; antennis nigris basi testaceis; thorace oblongo, globoso, punctato seriatim in disco; scutello punctato rufo; elytris, thorace longioribus, crebre rugosis cyaneis; abdomine leviter punctato, villosa. — Long. 5 mill.

Habitat in Pedemonti.

Ailé, brillant, testacé; avec la tête, la poitrine et les deux derniers segments noirs; la tête est ovale, en outre largement ponctuée, surtout sur les côtés; les mandibules sont ferrugineuses, avec leur extrémité noire; les palpes testacés, à avant-dernier et dernier articles noirâtres, couverts d'une pubescence blanche; les antennes noires, avec les quatre

(1) J'ai donné sa forme dans la description des caractères du genre.

premiers et la base du cinquième article testacés. Prothorax roux, globuleux, allongé, arrondi sur les côtés, aussi large en avant qu'en arrière ; de chaque côté deux séries de points légèrement marqués. Écusson roux, ponctué. Élytres bleues, plus longues et plus larges que le corselet, fortement ponctuées et rugueuses, la ponctuation grosse, éparses, recouvertes d'une pubescence courte, couchée et fauve. Abdomen d'un roux plus foncé que le corselet et les pattes, légèrement ponctué, parcimonieusement couvert de grands poils plus ou moins fauves. Pattes grêles, testacées, avec les genoux et *tous les tarsi* enfumés. ♂ plus étroit que la ♀ ; avant-dernier segment en cône, tronqué, d'un tiers plus étroit que celui de la ♀.

C'est le plus petit des *Pæderus* connus ; il est encore plus petit que mon *P. Corsicus* (1), dont il diffère par l'écusson roux, au lieu d'être noir, et du *P. riparius* Lin. également par l'exiguïté de sa taille et, surtout, *par les derniers articles des palpes* maxillaires entièrement enfumés, comme dans le *P. linnophilus* Er.

Espèce récoltée aux environs de Turin, par feu Truqui, et faisant partie de la collection de M. Chevrolat, qui en possède six exemplaires.

3. *POEDERUS VENTRICOSUS* Gautier des Cottes.

Apterus, nitidus, testaceus. Capite rotundato vage punctato, pectore, ultimis segmentis genibusque nigris. Antennis nigris, quatuor primis articulis ultimoque testaceis. Thorace oblongo-globosissimo, leviter seriatim punctato in disco. Scutello brunneo in triangulo elongato. Elytris nigro-violaceis, aspero punctatisque, thoracem brevioribus. Abdomine latissimo, villosa, punctato in ultimis segmentis. — Long. 8 mill.

Habitat in Pedemonti.

Ce *Pæderus* ressemble au *brevipennis* Er. ; mais il en diffère par la taille plus grande, les antennes plus grêles, à dernier article testacé ; par le corselet plus allongé, plus globuleux, plus large que la tête ; par les élytres encore plus courtes, d'un noir violet ; par l'abdomen très dilaté ; et enfin par la maculation des genoux beaucoup plus étendue.

Récolté en Piémont, par feu Truqui, et faisant partie de la collection de M. Chevrolat.

4. *CLYTUS BELLIERI* Gautier des Cottes.

Affinis CLYT. RHAMNI (Germar) ; *nigerrimus, latior, in thorace mar-*

(1) J'ai oublié de dire dans ma description que cet insecte vivait au bord de la mer.

gine antico et postico, scutello, in elytris puncto infrà humerum transverso, fascisque tribus latis (ultimâ obliquâ) flavis. — Long. 8 mill.

Habitat in Corsica.

Ce *Clytus* est au *Clytus Rhamni* (Germar) ce que son congénère, le *C. Lama* (Mulsant), est au *C. arietis* Lin.

Très noir, brillant, ressemble au *Rhamni* (Germar), mais plus grand et plus large, plus trapu. Antennes pâles, veloutées, plus renflées que dans le *Rhamni*. Corselet globuleux, rugueux, couvert de points réticulés; côtés, avant et arrière, bordés de jaune et parés de longs poils flaves. Écusson jaune. Élytres ornées : 1° d'un point obliquant en dedans de l'angle huméral vers la suture ; 2° d'une bande transverse, arquée, anguleuse, vers le haut de la suture ; 3° d'une bande inférieure transversale atteignant la suture et légèrement arquée ; 4° enfin d'une bande apicale placée en oblique sur le sommet de la suture à l'angle marginal; toutes, y compris le point, entièrement d'un beau jaune. Dessous du corselet et poitrine ornés d'une tache jaune allongée ; chaque segment de l'abdomen maculé de la même couleur. Pattes longues, revêtues d'une pubescence blonde ; cuisses très noires, scabreuses ; tibias et tarse plus clairs.

Espèce bien distincte des *Clytus Rhamni* Germar, *gazella* Lap. et Gory, *Tamesiensis* Germar et *Lama* Mulsant ; des trois premiers par le corps plus grand et plus large, la couleur noire très foncée et brillante, la tache ou bande apicale oblique au lieu d'être transversale, les antennes plus pâles et plus fortes, et enfin du dernier par une taille inférieure et le point huméral plus petit, pas prolongé, en forme de trait oblique.

Rapporté, par M. Bellier de la Chavignerie, des montagnes de la Corse, lors de son premier voyage.

